

## IHOPISTOKOKEESEEN ELI PRICK-TESTIIN TULEVALLE

Ihopistokoe on lähes kivuton välittömän allergian perustutkimus, ja se voidaan tehdä kaikenikäisille potilaille. Yhdellä testikerralla voidaan tutkia samanaikaisesti suuri joukko allergeeneja, ja tulos on nähtävissä 15 minuutin kuluttua.

### ENNEN TESTIIN TULOJA ON OTETTAVA HUOMIOON:

Luotettavan tuloksen saamiseksi ei saa käyttää antihistamiini- tai matkapahoinvointilääkkeitä **5 vuorokautta ennen** testipäivää.

Yleisimmin käytettyjä testiä häiritseviä lääkevalmisteita ovat:

Aerinaze	Dasselta	Kestox	Postafen
Aerius	Desloratadine	Lastin	Revitelle
Alzyr	Diphenhydramin	Levazyr	Rinexin
Atarax	Duact	Levocetirizin	Rinomar
Atosil	Dymista	Livostin	Telfast
Benadryl	Emadine	Loratadin	Tuulix
Cetimax	Gardex	Marzine	Xyzal
Cetirizin	Heinix	Nefoxef	Zaditen
Cirrus	Histadin	Nocedan	Zyrtec
Clarityn	Histec	Opatanol	
Codesan comp.			

(Lista ei ole välttämättä täydellinen.)

Mikäli käytössä on kortisonitablettilääkitys, joka on enemmän kuin 20 mg vuorokaudessa, ottakaa yhteys allergiatestiyksikköönne.

Hengitettävät astmalääkkeet eivät vaikuta testitulokseen. Silmätipat ja nenäsuihkeet, jotka eivät sisällä antihistamiinia, eivät vaikuta testitulokseen. (Huom! yllä oleva lista)

Ihopistokoe tehdään terveelle iholle.

Käsivarsiin ei tule käyttää voiteita edellisenä iltana eikä testipäivänä.

LISÄTIETOJA SAATTE TARVITTAESSA ALLERGIATESTIYKSIKÖSTÄNNE.