

TIPPURI

Tippuri on Neisseria gonorrhoeae -bakteerin aiheuttama seksiteitse tarttuva tulehdus. Tippurin itämisaika on hyvin lyhyt, oireita voi ilmaantua jo muutamassa päivässä tartunnan jälkeen. Kondomi suojaa tippuritartunnalta.

Oireet

- Miehillä on yleensä runsasta kellertävää vuotoa virtsaputkesta, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja virtsaamiskipua.
- Yli puolet tartunnan saaneista naisista on täysin oireettomia. Naisilla saattaa esiintyä virtsakirvelyä, lisääntynyttä virtsaamistarvetta, lisääntynyttä valkovuotoa ja alavatsakipua.
- Tippuri voi tarttua suuseksin välityksellä aiheuttaen suuontelon ja nielun tulehduksen.
- Anaaliseksi-tartunnasta voi aiheutua myös peräsuolen tulehdus.
- Tippuri voi tarttua eritteiden välityksellä myös potilaan omaan silmään aiheuttaen rajun sidekalvopunoituksen.
- Hoitamaton tippuri voi edetä myös lisäkiveksiin tai munanjohtimiin ja vaikeimmissa tapauksissa aiheuttaa lapsettomuutta.

Tutkimus ja hoito

- Tippuritartunta voidaan todeta ensivirtsanäytteestä, kohdunkaulan kanavasta, nielusta tai peräsuolesta otettavalla testillä. Bakteerin lääkeherkkyys varmistetaan ennen hoitoa viljelynäytteellä.
- Tippuri hoidetaan antibiooteilla, yleensä sekä pistoksella että tableteilla.
- Hoidon jälkeen kuukauden kuluttua varmistetaan taudin paraneminen uusilla näytteillä.
- Hoidon jälkeen on tärkeää käyttää kondomia jälkitarkastukseen saakka paranemisen varmistamiseksi ja tartuttamisen ehkäisemiseksi.
- Vakituinen seksikumppani hoidetaan aina samanaikaisesti, ja muut partnerit ohjataan tutkimuksiin.