

Ohje päivitetty 13.4.2021

Reumalääkkeet ja leikkaus lapsilla

Reumalääkkeiden tauotus lasten toimenpiteissä

Tavanomaisten reumalääkkeiden, solunsalpaajien ja biologisten reumalääkkeiden geneeriset ja valmistenimet näet oheisissa taulukoissa.

Jos biologinen lääke tauotetaan lapsen elektiivisessä ortopedissä leikkauksessa, noudatetaan samoja ohjeita, kuin aikuisreumatologiassa. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos annettaisiin. (Kts. Taulukko1). Tavallisesti biologinen lääkitys voidaan aloittaa uudelleen 1-2 viikon kuluttua, kunhan leikkaushaava on parantunut. Leikkaus- ja syvien infektioiden aikana solunsalpaaja- ja biologiset lääkkeet pidetään tauolla.

Huom! Erityisen suuren riskin potilailla voidaan joutua miettimään laajempia tauotuksia.

Isoannoksinen glukokortikoidi (yli 0,5-1,0mg/kg/vrk tai yli 10 mg) lisää infektioriskiä ja voi vaikeuttaa haavan paranemista.

Tavallisimmissa lasten toimenpiteissä ei tavanomaista reumalääkitystä tai solunsalpaajia tarvitse tauottaa. Biologinen lääke tauotetaan vain, jos operoitava kohde on valmiiksi infektoitunut.

Reumalääkkeiden tauotus elektiivisissä ortopedisissä leikkauksissa lapsilla

1. Tavanomaiset reumalääkkeet

Lääke	Kauppanimi®	Lääketauko ennen leikkausta	Lääketauko leikkauksen jälkeen
Hydroksiklorokiini	Oxiklorin	Ei taukoa	Ei taukoa
Klorokiini	Resochin	Ei taukoa	Ei taukoa
Pistoskulta	Myocrisin	Ei taukoa	Ei taukoa
Sulfasalatsiini	Salazopyrin	Ei taukoa	Ei taukoa

2. Solunsalpaajat

Lääke	Kauppanimi®	Lääketauko ennen leikkausta	Lääketauko leikkauksen jälkeen
Atsatiopriini	Azamun, Imurel	Ei taukoa	Ei taukoa
Leflunomidi	Arava, Leflunomide	Ei taukoa	Ei taukoa
Metotreksaatti	Ebetres, Metoject, Methotrexate, Trexan	Ei taukoa	Ei taukoa
Mykofenolaatti	Cellcept, Mychophenolate mofetil	Ei taukoa	Ei taukoa
Siklosporiini	Sandimmun	Ei taukoa	Ei taukoa
Syklofosfamidi	Sendoxan, Syklofosfamid	1 viikko	1 viikko

3. Biologiset reumalääkkeet

Lääke (annosmuoto)	Kauppanimi ®	Lääketauko ennen leikkausta	Lääketauko leikkauksen jälkeen
Abatasepti (iv)	Orencia	4 viikkoa	2 viikkoa
Abatasepti (sc)	Orencia	1 viikko	2 viikkoa
Adalimumabi (sc)	Humira, Hulio, Amgeviata, Hyrimoz	2 viikkoa	2 viikkoa
Anakinra (sc)	Kineret	1 päivä	2 viikkoa
Belimumabi (iv)	Benlysta	4 viikkoa	2 viikkoa
Etanersepti (sc)	Enbrel, Erelzi	1 viikko	2 viikkoa
Golimumabi (sc)	Simponi	4 viikkoa	2 viikkoa
Iksekitsumabi (sc)	Taltz	4 viikkoa	2 viikkoa
Infliksimabi (iv)	Remicade, Inflectra, Remsima	4-8 viikkoa	2 viikkoa
Rituksimabi (iv)	Mabthera	4-6 kuukautta	1 kuukausi
Sarilumabi (sc)	Kevzara	2 viikkoa	2 viikkoa
Sekukinumabi (sc)	Consentyx	4 viikkoa	2 viikkoa
Sertsolitsumabi (sc)	Cimzia	2 viikkoa	2 viikkoa
Tosilitsumabi (iv)	RoActemra	4 viikkoa	2 viikkoa
Tosilitsumabi (sc)	RoActemra	1 viikko	2 viikkoa
Ustekinumabi (sc)	Stelara	4 viikkoa (lääkkeen antoväli 12 vk)	2 viikkoa

4. Uudet synteettiset reumalääkkeet

Lääke (annosmuoto)	Kauppanimi®	Lääketauko ennen leikkausta	Lääketauko leikkauksen jälkeen
Apremilasti	Otezla	Ei taukoa	Ei taukoa
Barisitinibi	Olumiant	1 viikko	2 viikkoa
Tofasitinibi	Xeljanz	1 viikko	2 viikkoa

Reumalääkkeiden tauotus tavallisimmissa lasten toimenpiteissä

Toimenpide	Tavanomainen reumalääke / solunsalpaaja	Biologinen reumalääke	Muuta huomioitavaa
Korvien putkitus	Ei taukoa	Ei taukoa	
Kitarisan poisto	Ei taukoa	Ei taukoa	Biologinen lääke tauolle vain, jos märkäpesäke
Nielurisan poisto	Ei taukoa	Ei taukoa	Biologinen lääke tauolle vain, jos märkäpesäke
Luomen poisto	Ei taukoa	Ei taukoa	
Iho- tai lihasbiopsia	Ei taukoa	Ei taukoa	
Gastro- tai kolonoskopia	Ei taukoa	Ei taukoa	
Kiilaekskisio	Ei taukoa	Ei taukoa	Biologinen lääke tauolle vain, jos jatkuva märkiminen
Artroskopia	Ei taukoa	Ei taukoa	
(Hemi)epifyseodeesi; alaraajan valgus- tai pituuserokorjausleikkaus	Ei taukoa	Ei taukoa	
Traumaortopedia	Ei taukoa	Ei taukoa	Biologisen lääkkeen tauotus tapauskohtaisesti, huomioiden esim. eksterni fiksaatio, avomurtuma