

JÄLKIHOITO-OHJEITA IHOKOEPELAN OTON JÄLKEEN

(SPONGOSTAN)

Koepalan ottokohtaan on laitettu pieni pala verenvuotoa tyrehtyttävää levyä (Spongostan), joka on kiinnitetty paikoilleen ihoteipillä ja haavasidoksella. Alue tulee pitää kuivana kaksi vuorokautta.

Poista sidokset kahden vuorokauden kuluttua. Jos sidokset eivät irtoa helposti, kostuta aluetta vedellä. Sidosta ei saa repiä irti, ettei haava ala vuotaa verta. Tarkista lopuksi, että sidosmateriaalia tai Spongostania ei jää iholle.

Aluetta on hyvä sidosten poiston jälkeen suihkutella päivittäin vedellä, kunnes haavauma on parantunut. Tarvittaessa alueen voi suojata pienellä haavatyynyllisellä laastarilla.

Saunomista, uimista tai kylpemistä suositellaan vasta kun alue on parantunut.

Jos toimenpidealueella esiintyy runsasta vuotoa (pieni verenvuoto tyrehtyy painamalla haavaa keskeytyksettä 10-20 minuuttia), särkyä, turvotusta tai kuumotusta, ota yhteys hoitopaikkaasi tai päivystykseen.

Ellei toisin ole sovittu, tieto koepalavastauksesta ja jatkosuunnitelmista lähetetään sinulle kirjeellä kotiin noin 1 kk kuluttua toimenpiteestä.