

Korvakipu

Korvakivun syynä on yleensä flunssan ja niistämisen yhteydessä välikorvaan joutunut lima ja ilmanpaine, joka venyttää tärykalvoa. Korvakipu voi aiheutua myös tulehduksesta tai muusta ärsytyksestä. Korvakipua voi lievittää särkylääkkeillä.

Yleistä

Aikuisilla välikorvan tulehdusta yleisempi korvakivun aiheuttaja on korvakäytävän tulehdus. Korvakäytäväntulehdukseen liittyy usein kivun lisäksi samea vuoto ja korvakäytävän turpoaminen, joka saattaa heikentää kuuloa. Korvakipua voivat aiheuttaa myös muut kuin korvassa olevat vaivat. Kipu voi olla peräisin purentaelimistä, korvasylkirauhasesta, kieli-kitahermosta, nielusta tai niskasta. Kylmä tuuli ja paineenvaihtelu voivat myös aiheuttaa korvakipua.

Itsehoito

Korvakipua voi hoitaa apteekista ilman reseptiä saatavilla ibuprofeiinia tai paracetamolia sisältävillä kipulääkkeillä. Apteekin henkilökunta auttaa tarvittaessa oikean tuotteen valinnassa. Korvaa ei kannata kaivaa pumpulitikulla tai muulla korvakäytävän suuaukkoa pidemmälle ulottuvalla välineellä. Kaivaminen voi aiheuttaa lisää kipua ja mahdollisesti tulehdusta.

Milloin yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen?

Terveydenhuollon ammattilaiseen on syytä olla yhteydessä, jos

- korvakipu on kovaa ja/tai alkanut nopeasti.
- korvasta vuotaa eritettä tai verta.
- korvakipuun liittyy huimausta.
- korvakipuun liittyy kuumetta.
- särkylääke ei auta kipuun parissa vuorokaudessa.

Aiheeseen liittyvää

- Korvakäytävän tulehdus (Terveyskirjasto.fi)
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00578
- Korvakipu ja vuoto korvakäytävästä aikuisella (Terveyskirjasto.fi)
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00277

Yhteistyössä mukana:

DUODECIM
TERVEYSKIRJASTO

Versio 2.0 12.2.2021