

Ihopistokoe eli prick-testi

Ihopistokoe on lähes kivuton välittömän allergian perustutkimus ja se voidaan tehdä kaikenikäisille potilaille. Yhdellä testikerralla voidaan tutkia samanaikaisesti useita allergeeneja ja tulos on nähtävissä 15 minuutin kuluttua.

Luotettavan tuloksen saamiseksi ei saa käyttää antihistamiini- tai matkapahoinvointilääkkeitä viiteen vuorokauteen ennen testipäivää.

Yleisimmin käytettyjä testiä haittaavia lääkevalmisteita ovat:

<i>Vaikuttava aine</i>	<i>Valmisteiden nimiä, esim.</i>
Akrivastiini	Benadryl, Duact
Bilastiini	Revitelle
Desloratadiini	Aerinaze, Aerijs, Carelin, Dasselja, Desloratadin, Desloratadine, Deslox, Flynise, Kevenix
Ebastiini	Ebastin, Kestine, kestine Lyo, Kestox
Fexofenadiini	Fexofenadine, Fexorin, Telfast
Hydroksitsiini	Atarax, Hydroxyzine Orifarm
Levosetiritsiini	Levazyr, Levocetirizin, Nosedan, Xyzal
Loratadiini	Loratadin
Setiritsiini	Alzyr, Cetimax, Cetirizin, Cirrus, Heinix, Histec, Zyrtec

Silmätipat ja nenäsuihkeet

Atselastiini	Dymista, Lastin
Emedastiini	Emadine
Ketotifeeni	Zaditen
Olopatadiini	Opatanol

Matkapahoinvointilääkkeet

Meklotsiini	Postafen
Syklitsiini	Marzine, Cyclizine lactate

Muut (erityislupavalmisteet ja harvinaiset lääkkeet)

Atosil, Dormix, Cyclizine, Peritol, Rinexin, Tavegyl, Theralene Codesan Comp, Diphenhydramin, Hevert-Dorm

Huomioitavaa

- Testejä ei tehdä raskauden aikana.
- Mikäli käytössä on kortisonitablettilääkitys merkittävällä annoksella (esim. Prednison tai Prednisolon vähintään 20 mg vuorokaudessa), ottakaa yhteys Iho- ja Allergiasairaalaan hoitamaan yksikköön.
- Hengitettäviä astmalääkkeitä saa käyttää normaalisti ennen testiä. Silmätippoja ja ne-näsuihkeita, jotka eivät sisällä antihistamiinia, saa käyttää normaalisti ennen testiä.
- Ihopistokoe tehdään kyynärvarren terveelle iholle. Älä käytä mitään voiteita käsivarsiin vuorokauteen ennen testiä.