

## KLAMYDIA

Klamydia on *Chlamydia trachomatis* bakteerin aiheuttama seksiteitse tarttuva tulehdus. Itämisaika tartunnasta oireiden alkuun on 1-2 viikkoa, mutta valtaosa tartunnan saaneista on täysin oireettomia. Myös oireeton klamydia tarttuu ja se voidaan todeta vain klamydiatestillä.

### Oireet

- virtsakirvelyä, tihentynyttä virtsaamistarvetta, alaselkä- ja vatsakipuja.
- naisilla lisääntyntä valkovuotoa ja veristä vuotoa
- miehillä vuotoa virtsaputken suulta
- nielussa ja peräaukossa tartunta usein oireeton
- voi myös aiheuttaa silmätulehduksen ja niveloireita.
- Klamydia voi tarttua eritteiden välityksellä myös potilaan omaan silmään aiheuttaen sidekalvon tulehduksen.
- Hoitamattomana tauti voi levitä naisilla munasarjatulehdukseksi tai miehillä lisäkivestulehdukseksi aiheuttaen lapsettomuutta.

### Tutkimus ja hoito

- Klamydia voidaan todeta helposti virtsanäytteestä tai vanutikulla otetusta näytteestä virtsaputkesta, nielusta, peräaukosta tai kohdunkaulakanavasta riippuen seksitavoista
- Testiin voi hakeutua esim. omalle terveysasemalle tai sukupuolitautilien poliklinikalle, joissa tutkimus ja hoito ovat maksutonta.
- Klamydia hoidetaan antibioottikuurilla.
- Seksikumppanit on informoitava klamydiatartunnasta, jotta nämä osaisivat hakeutua tutkimuksiin ja hoitoon. Hoidon jälkeen kuukauden kuluttua varmistetaan taudin paraneminen uusilla näytteillä.
- Hoidon jälkeen on tärkeää käyttää kondomia jälkitarkastukseen saakka paranemisen varmistamiseksi ja tartuttamisen ehkäisemiseksi.