

REUMALÄÄKKEIDEN TAUOTUKSET ELEKTIIVISTEN REUMALEIKKAUSTEN YHTEYDESSÄ

Tutkimusnäyttö lääketaukojen pituudesta on vähäinen. Ennen leikkausta suositellaan yksilöllistä arviota, jossa huomioidaan infektioriskit, leikkaustyyppi sekä reumasairauden aktivaatoriski. Jos erityistä infektioriskiä ei ole, tarve lääketauotuksille vähäisempi.

Erityisen suuren riskin potilaalla voidaan joutua miettimään laajempia tauotuksia. Isoannoksinen glukokortikoidi (yli 10mg prednisolonia) lisää infektioriskiä ja voi vaikeuttaa haavan paranemista. Tavallisesti biologinen lääkitys voidaan aloittaa uudelleen 1-2 viikon kuluttua, kunhan leikkaushaava on parantunut. Leikkaus- ja syvien infektioiden aikana solunsalpaajalääkkeet, biologiset lääkkeet ja uudet synteettiset reumalääkkeet (lukuun ottamatta apremilastia) pidetään tauolla.

Versio 28.6.2024

Tavanomaiset reumalääkkeet

Lääke	Kauppanimi [®]	Lääketauko leikkauksen yhteydessä	
		Ennen	Jälkeen
Hydroksiklorokiini	Oxiklorin	Ei taukoa	Ei taukoa
Klorokiini	Resochin	Ei taukoa	Ei taukoa
Sulfasalatsiini	Salazopyrin	Ei taukoa	Ei taukoa

Solunsalpaajat

Lääke	Kauppanimi [®] (yleisimmät)	Lääketauko leikkauksen yhteydessä*	
		Ennen	Jälkeen
Atsatiopriini	Azamun, Imurel	Ei taukoa	Ei taukoa
Leflunomidi	Arava, Leflunomide	Ei taukoa	Ei taukoa
Metotreksaatti	Ebetrex, Metoject, Methotrexate, Trexan	Ei taukoa	Ei taukoa
Mykofenolaatti	Cellcept, Mycophenolate mofetil	Ei taukoa	Ei taukoa
Siklosporiini	Sandimmun	Ei taukoa	Ei taukoa
Syklofosfamidi	Sendoxan, Syklofosamid	1 viikko	1 viikko

Biologiset reumalääkkeet (leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos annettaisiin)

Lääke (annosmuoto)	Kauppanimi [®] (yleisimmät)	Lääketauko leikkauksen yhteydessä	
		Ennen	Jälkeen
Abatasepti (iv)	Orencia	4 viikkoa	2 viikkoa
Abatasepti (sc)	Orencia	1 viikko	2 viikkoa
Adalimumabi (sc)	Humira, Hulio, Amgevita, Hyrimox	2 viikkoa	2 viikkoa
Anakinra (sc)	Kineret	1 päivä	2 viikkoa
Anifrolumabi (iv)	Saphnelo	4 viikkoa	2 viikkoa
Belimumabi (iv)	Benlysta	4 viikkoa	2 viikkoa
Bimekitsumabi (sc)	Bimzelx	4 viikkoa (lääkkeen antoväli 4-8vk)	2 viikkoa
Etanersepti (sc)	Enbrel, Erelzi	1 viikko	2 viikkoa
Golimumabi (sc)	Simponi	4 viikkoa	2 viikkoa
Guselkumabi (sc)	Tremfya	4 viikkoa ((lääkkeen antoväli 8 vk)	2 viikkoa
Iksekitsumabi (sc)	Taltz	4 viikkoa	2 viikkoa
Infliximabi (iv)	Remicade, Inflectra, Remsima	4-8 viikkoa	2 viikkoa
Infliximabi (sc)	Remsima	2 viikkoa	2 viikkoa
Risankitsumabi (sc)	Skyrizi	4 viikkoa (lääkkeen antoväli 12 vk)	2 viikkoa
Rituksimabi (iv)	Mabthera, Ritemvia	4-6 kuukautta	1 kuukausi
Sarilumabi (sc)	Kevzara	1 viikko	2 viikkoa

Sekukinumabi (sc)	Cosentyx	4 viikkoa	2 viikkoa
Sertolitsumabi (sc)	Cimzia	2 viikkoa	2 viikkoa
Tosilitsumabi (iv)	RoActemra	4 viikkoa	2 viikkoa
Tosilitsumabi (sc)	RoActemra	1 viikko	2 viikkoa
Ustekinumabi (sc)	Stelara	4 viikkoa (lääkkeen antoväli 12 vk)	2 viikkoa

Uudet synteettiset reumalääkkeet

Lääke	Kauppanimi[®]	Ennen	Jälkeen
Apremilasti	Otezla	Ei taukoa	Ei taukoa
Barisitinibi	Olumiant	3 päivää	2 viikkoa
Filgotinibi	Jyseleca	3 päivää	2 viikkoa
Tofasitinibi	Xeljanz	3 päivää	2 viikkoa
Upadasitinibi	Rinvoq	3 päivää	2 viikkoa